



৪। আঙ্গোক ব্যবস্থাঃ স্ত্রীভাৱে বাচ্চাকে কমপক্ষে ক্ৰীমকাজল ১০ দিন এবং শীতকালে ১৫ দিন স্ত্ৰীভিৎ কৰতে হ'ব। স্ত্ৰীভাৱে তাপমাত্ৰ ৯৫° ফাঃ, ৯০° ফাঃ, ৮৫° ফাঃ, ৮০° ফাঃ এভাবে কমতে হ'বে এবং নৰ্বনা আঙ্গোক ব্যবস্থা থাকতে হ'বে। তাপমাত্ৰ ও আঙ্গোক ব্যবস্থা সঠিক না হ'লে বাচ্চা বিভিন্ন অসুখে আক্ৰান্ত হ'বে; ছোট-বড় হ'বে এবং ঘোৰ জল হ'বে না। ছাত্ৰা ২০% এৰ মত বাচ্চা যাবা যাওৱাৰ সম্ভাৱনাই বেশী।

৫। বাচ্চাৰ খাদ্যৰ পৰিমাণঃ খাৰ্জিক কাম্পৰেন ও জিইভিৎ জাতৰ বাচ্চাৰ ১ম দিন খাদ্য দৰকাৰ ৮-৯ গ্রাম, ২য় দিন ৯-১০ গ্রাম, ৩য় দিন ১০-১১ গ্রাম এবং ৪ৰ্থ দিন ১১-১২ গ্রাম এভাবে খাদ্যৰ পৰিমাণ বাঢ়াতে থাকে। ইভিয়ান ফাৰাৰ হাঁসেৰ বাচ্চাৰ খাদ্য জনেৰ ১ম দিন ৫-৬ গ্রাম, ২য় দিন ৬-৭ গ্রাম, ৩য় দিন ৭-৮ গ্রাম এভাবে প্রতিদিন ১ গ্রাম কৰে বাঢ়াতে হ'বে। বেইজিং জাতৰ হাঁসেৰ বাচ্চাৰ জনেৰ ১ম দিন ১০-১২ গ্রাম, ২য় দিন ১২-১৪ গ্রাম, ৩য় দিন ১৪-১৬ গ্রাম এভাবে বাঢ়াতে হ'বে। আক্ৰান্তিকভাবে খাদ্য পেলে কম পৰিমাণ খাদ্য লিতে হ'বে। আৰো জানতে হ'বে পুৰুলট হাঁসেৰ খাদ্য, মাংস উৎপাদনকাৰী হাঁসেৰ খাদ্য এবং ভিন্ন উৎপাদনকাৰী বিভিন্ন জাতৰ হাঁসেৰ খাদ্য। অন্যথাৰ ক্ষতিৰ সম্ভাৱনা বেশী।

৬। বাচ্চাকে পানিতে ছাত্ৰাৰ সময়ঃ সেন্দী ও বিনেসদী যে কোন হাঁসেৰ বাচ্চাৰে ক্ৰীতকালে ২০ দিন এবং ক্ৰীমকাজল ১৫ দিনেৰ আগে পানিতে ছাত্ৰা যাবে না। প্রথম দিন ১/২ ফটা, ২য় দিন ১ ফটা এভাবে পানিতে রাখাৰ অভ্যাস কৰন। ২৫ দিন পর থেকে যত সময়ই পানিতে থাকুক না কেন সমস্যা হ'বে না।

৭। হাঁসেৰ বাচ্চাৰ টিকা প্রদানঃ বয়স ১৮-২০ দিন ডাকপ্লেগ টিকা। ৪৫-৫০ দিন বয়সে কলেবৰ টিকা এবং ৭০-৮০ দিন বয়সে টাইফয়েড টিকা দিবেন। প্রথম টিকা দেয়াৰ পর ৩ মাস পর পর উক্ত টিকাভালিৰ বুস্টাৰ ডোজ দিবেন। টাইফয়েড টিকা দেয়া জৰুৰী। এতে হাঁস বা মূৰগি সালমোনেলা ও ইকলাই ভোপ থেকে রক্ষা পায়। টিকা দেয়াৰ আগে এবং পরেৰ দিন Immue safe/Betalyte/Immolyte খেতে দিতে হ'বে। ৫ গ্রাম প্রতিদিন ১০০ হাঁসেৰ জন্য।

৮। কুৰিনাশক ব্যবস্থাঃ নাখাৰণত: ৫০ দিন বয়সে কুৰিনাশক ঔষুধ খাওৱাৰো উচিত। এরপর প্রতি ৩-৪ মাস পরপর কুৰিনাশক ঔষুধ খাওৱাবেন।

৯। হাঁসেৰ মতেৰ জয়গাঃ শুধুমাত্ৰ ৪৫ দিনেৰ মতেৰে ১ - ১ ১/২ ফুট হাঁস প্রতি। আৱল-অৱস্থাৰ পালন কৰলে ১ ১/২ - ২ ফুট হাঁস প্রতি।

১০। নিষেধঃ

- ১) হাঁস-মূৰগি একত্ৰে পালন কৰা যাবে না।
- ২) ১৫ দিনেৰ আগে হাঁসকে পানিতে ছাত্ৰা যাবে না।
- ৩) টিকা দেয়াৰ পর কমপক্ষে ৫-৭ দিন কোন ঙ্কাৰ Antibiotic ঔষুধ খাওৱাৰো যাবে না।
- ৪) অতিবাৰ টিকা দেয়াৰ পর অতিরিক্ত টিকা মাটিতে/পানিতে ফেলা যাবে না। মাটিতে গৰ্ত কৰে পুতে রাখতে হ'বে।
- ৫) ভিন্ন ভিন্ন বয়সেৰ বাচ্চাকে একত্ৰে পালন কৰা যাবে না।
- ৬) ছোট বাচ্চাকে Antibiotic দিলে পা ঙ্কাৰে যাবে এবং বাচ্চা প্যাৰালাইসিস হওৱাৰ সম্ভাৱনা বেশী।

১১। পৰামৰ্শঃ

- ১) টিকা দেয়াৰ আগে এবং পরে Immue safe/ Betalyte/ Immolyte (মোট = ২ দিন) খেতে দিবেন। মাত্ৰা ৫ গ্রাম = ১০০ হাঁসেৰ জন্য প্রতিদিন ১ বাৰ।
- ২) বাচ্চাৰ বয়স ১৫ দিন হ'লে হাঁসপ্রতি ৫ গ্রাম কৰে সবুজ ঘাস, লালশাক, গুইলাক বা কলমিশাক খেতে দিন। এতে হজমশক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং ডিউমিনেৰ অভাৱও পূৰণ হ'বে।
- ৩) পাতলা পায়খানা হ'লে শুধুমাত্ৰ খাবাৰ স্যালাইন খেতে দিন।
- ৪) বাচ্চাৰ বৃদ্ধিৰ সাথে সাথে খাবাৰ পাত্ৰ ও পানিৰ পাত্ৰ বৃদ্ধি কৰন।