

ঘনকুয়াশা ও শৈত্যপ্রবাহকৃষকভাইদেরকরণীয়

জানুয়ারীমাসেবিভিন্নসময়েনিম্নতাপমাত্রা, ঘনকুয়াশা, গুঁড়িগুঁড়িবৃষ্টি ও মেঘলাআবহাওয়াবোরোবীজতলা, আলুটমেটো, সরিষা, সীম, পান, আম, লিচু, কুল ও অন্যান্যফসলেরজন্যক্ষতিকর। এ অবস্থাহতেফসলসমূহকেরক্ষারজন্যকৃষকভাইদেরনিম্নলিখিতপদক্ষেপগ্রহণকরারপরামর্শদেয়াযাচ্ছে।

বোরোবীজতলাঃ

ঘনকুয়াশা, নিম্নতাপমাত্রা ও শৈত্যপ্রবাহেরফলেবোরোবীজতলাকোল্ডইনজুরিরকারণেচারাহলুদহয়েমারাযাওয়া, চারাক্ষসা ও কৃসেকরোগেআক্রান্তহতেপারে।

সেক্ষেত্রে-

- প্রতিদিনসন্ধ্যায়বীজতলাডুবিয়েসেচদিতেহবেএবংসকালেপানিবেরকরেদিতেহবে।
- আবহাওয়াকুয়াশাছন্নহলেবীজতলাস্বচ্ছপলিথিনদিয়েরাতদিনঢেকেরাখতেহবেএবংরোদহলেপলিথিনউঠিয়েফেলতেহবে।
- সকালেচারারউপরদিয়দড়িটেনেশিশিরবারিয়েদিতেহবে, এতেচারাকোল্ডইনজুরিথেকেরক্ষাপাবে।
- প্রতিশতাংশবীজতলায় ৪০০ গ্রামজিপসাম, ২৮০ গ্রামইউরিয়া ও ২ কেজিছাইপ্রয়োগকরলেউপকারপাওয়াযাবে।
- চারাক্ষসা ও চারামরারোগেরজন্যমেনকোজেবপ্রতিলিটারপানিতে ২ গ্রামহারেমিশিয়েবীজতলায়স্প্রেসকরতেহবে।

আলু ও টমেটোঃ

শৈত্যপ্রবাহচলাকালেঘনকুয়াশাথাকলেআলু, টমেটোক্ষেতেনাবীক্ষসা ও আগামক্ষসারোগদেখাদিতেপারে। এ অবস্থাত্থেকেআলু ও টমেটোফসলরক্ষাকরতে-

- মড়কদেখাদেওয়ারপূর্বেইভেলিবেঁধেদেওয়ারপরপ্রতিরোধকহিসেবেস্পর্শজাতীয়ছত্রাকনাশকযেমনডাইথেন এম-৪৫/ইন্ডোফিল এম-৪৫/সিকিউর/মেলোডিডিও ২ গ্রাম/লিটারপানিতেমিশিয়ে ৭ দিনপরপরস্প্রেসকরতেহবে।
- যেসকলজমিতেইতোমখ্যেডকদেখাদিয়েছেসকলজমিতেরিডোমিলগোল্ড (২.৫ গ্রাম/লিটার)/ক্যাবরিওটপ(৩ গ্রাম/লিটার)/নিউবেন (২ গ্রাম/লিটার)/একরোভেটএ,জেড (৪ গ্রাম/লিটার)/করমিল (২ গ্রাম/লিটার)/নাজহ (২ গ্রাম/লিটার) ৭ দিনপরপরস্প্রেসকরতেহবে। স্প্রেসকরারসময়পাতারউপর ওনিচেভালভাবেভিজিয়েদিতেহবে।
- আলুরজমিতেমড়কদেখাদিলেইউরিয়াউপরিপ্রয়োগ ও সেচপ্রদানবন্ধরাখতেহবে।
- এছাড়াওজাবপোকা ও সাদামাছিপোকাদমনেরজন্যতুন্দ্রা/এসটিফ ১ গ্রাম/লিটারপানিবাভলিয়মফ্লেক্সি ৫ গ্রাম/১০লিটার পানিবাম্যালাথিয়নজাতীয়যেকোনকীটনাশকঅনুমোদিতমাত্রায়স্প্রেসকরাযেতেপারে।

ভুট্টাঃ

- ভুট্টাক্ষেতেরগাছেরগোড়ারমাটিতুলেদিতেহবে।
- ভুট্টাফসলেএইজেডওজাতঅনুসারেবীজগজানোর২৫-৩০দিনপরপ্রথমকিস্তিএবং৪০-৪৫দিনপরদ্বিতীয়কিস্তিইউরিয়াওএমওপিসারপ্রয়োগকরতেহবে।
- ভুট্টারসাথেসাথীবামিশ্রফসলেরচাষকরেথাকলেসেগুেলোরপ্রয়োজনীয়পরিচর্যাকরতেহবে।
- ভুট্টাফসলেফলআর্মিওয়ামপোকাকরআক্রমণদেখাদিতেপারে, কাজেইনিয়মিতমনিটরিং, স্কাউটিংওপ্রয়োজনদমনব্যবস্থানিতেহবে। মনিটরিংএরজন্যফেরোমনট্রাপ (একরপ্রতি৫টি) ব্যবহারকরতেহবে।

সরিষা/সীমঃ

মেঘলাআবহাওয়ায়সরিষাক্ষেত ও সীমগাছেজাবপোকাকরআক্রমণহতেপারে। আক্রমণদেখাদিলেজৈববালানাইনাশকহিসেবেবিষকাটালীরস, নিম/তামাকপাতাররসপ্রয়োগকরতেহবে। আক্রমণতীব্রহলেম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসিজাতীয়কীটনাশকপ্রতিলিটারপানিতে ২ মিলিলিটারহারেমিশিয়েফসলেস্প্রেসকরতেহবে।

পানঃ

ঘনকুয়াশা, নিম্নতাপমাত্রা ও শৈত্যপ্রবাহেরফলেপানগাছেরপাতাঝরেযাওয়া/পাতাহলুদহয়েযাওয়াইত্যাদিসমস্যাদেখাদিতেপারে। এ অবস্থায়-

- পানবরজেরবেড়া ও ছাউনিঘনকরমেমরামতকরতেহবেযাতেকুয়াশা ও বাতাসপানবরজেডুকতেনাপারে। বিশেষতঃউত্তরপার্শ্বেরবেড়াভালভাবেদিতেহবে।
- আক্রান্তমরাপানগাছ, লতা-পাতাভালোভাবেবেছবরজপরিষ্কারকরেমাটিতেপুঁতেফেলতেহবেকিংবাপুড়িয়েফেলতেহবে।
- সরাসরিসরিষারখেল ও নাইট্রোজেনসারপ্রয়োগকরাযাবেনা। খেলভিজিয়ে ৭/৮ দিনপচানোরপরতাসুকিয়েপ্রয়োগকরতেহবে।
- পানেরলতা ও পাতারপচনরোগদমনেরজন্য (মেলোডিডিওপ্রতিলিটারপানিতে ২ গ্রাম)/সিকিউর (১ গ্রাম/লিটারপানিতে)/জিটালাক্স ২৫ ডব্লিউপিঅনুমোদিতমাত্রায়আক্রান্তলতা ও পাতায় ১০ দিনঅন্তরঅন্তরভালোভাবেভিজিয়েস্প্রেসকরতেহবে।

আম, লিচু ও কুলঃ

ঘনকুয়াশারকারণেআম, লিচু ও কুলগাছেরমুকুলনষ্টহওয়ারআশংকারয়েছে। এসময়হপারপোকাদমনেসাইপারমেথ্রিনজাতীয়কীটনাশক ১ মিলি/লিঃহারেপুরোগাছেস্প্রেসকরতেহবে।

এনথ্রাকনোজরোগদমনেপ্রতিরোধকহিসেবেকার্বেন্ডাজিম/প্রোপিকোনাজলজাতীয়ছত্রাকনাশকঅনুমোদিতহারেস্প্রেসকরতেহবে।

**তাহাডাকৃষিরযেকোনসমস্যায়উপজেলাকৃষিঅফিসঅথবা কৃষিকলসেন্টারের১৬১২৩নম্বরেবা কৃষকবন্ধুসেবার৩৩৩১নম্বরেকলকরেবিশেষজ্ঞদেরপরামর্শনি
তেপারেন।**